




1 Συγχρονισμένη απελευθέρωση αζώτου



2 Αξιοποίηση τροφής



3 Βελτίωση αποδόσεων



Συνιστώμενες δόσεις TIMAFEEED Boost:

Όταν χρησιμοποιείται ως μοναδική πηγή ουρίας ζωοτροφών

Μοσχίδες & βοοειδή πάχυνσης:
45 g / 100 kg σωματικού βάρους / ημέρα

Αγελάδες θηλάζουσες:
300 g / ζώο / ημέρα

Πρόβατα & αίγες πάχυνσης:
40 g / 100 kg σωματικού βάρους / ημέρα

Οδηγίες χρήσης

- Η μικροβιακή χλωρίδα χρειάζεται χρόνο προσαρμογής.
- 1η εβδομάδα: μισή δόση TIMAFEEED Boost
- 2η εβδομάδα: ¾ της δόσης
- 3η εβδομάδα: πλήρης δόση

TIMAFEEED BOOST



ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ



Ενεργοποιητής αζώτου μεγάλης κοιλίας

Σταδιακή απελευθέρωση




Μεγαλύτερη
διαθεσιμότητα του
αζώτου με την
πάροδο του
χρόνου

Καλύτερη εκμετάλλευση της τροφής



Διατήρηση σταθερού του pH


+ 0.73 βαθμούς
pH πεπτικού συστήματος*



Αποτελεσματικότητα τα ζυμώσεων

+7%

Παραγωγή
προπιονικού οξέος



Αποτελεσματικότητα τα ζυμώσεων

+10 πόντους
Αποτελεσματικότητας
Θρέψης



Αποτελεσματικότητα α χρήσης αζώτου

-44%

Το αμμωνιακό άζωτο
στη μεγάλη κοιλία
περιορίζει τον κίνδυνο
στο ήπαρ



* Τεχνητή μεγάλη κοιλία CMI Roullier



ogm free

